


হোমিও রত্নমালা

(অব্যর্থ ব্যবস্থাপত্রাবলী)



৩য় সংস্করণ
(পরিবর্দ্ধিত ও পরিমার্জিত)

ডাঃ ধনমোহাম্মদ সরকার
(হোমিওপ্যাথ)

সূচীপত্র

		<u>পৃষ্ঠা</u>
নিবেদন :	লেখক	(i)
আশীর্বাণী :	ডাঃ মহেন্দ্র সিং	(iv)
আমার কথা :	ডাঃ মুহম্মদ আজমাল হোসেন	(v)
খ্যাতনামা চিকিৎসকগণের অব্যর্থ ব্যবস্থাপত্রাবলী		১
লক্ষণ সাহায্যে রোগ ও রোগের ভাবীফল নির্ণয়		৬৫
বিপরীত লক্ষণ ও তাহার ঔষধ		৭০
সহায়ক সার-সংগ্রহ		৭৬
রকমারি		৮৪
এ্যালোপ্যাথিক ড্রাগস-এর পরিবর্তে হোমিওপ্যাথি		৮৬
ঔষধ সূচী		৮৮
নির্দেশিকা		৯৪

খ্যতনামা-চিকিৎসকগণের অব্যর্থ ব্যবস্থাপত্রাবলী

- ১) তরুন ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমায় এড্রিনেলিন ক্লোরাইড ২০০ নাটকীয়ভাবে উপশম দিতে পারে, কিন্তু দুর্বলতার জন্য আসেনিকের স্বরণ করতে হয়।

— হোমিও রেকর্ডার, ফেব্রুঃ ১৯২৪

- ২) এড্রিনেলিন ২০০ থেকে ১০ এম উচ্চ রক্তচাপে এবং পীড়ার পরিণাম ফলের ক্ষেত্রে অত্যন্ত উপকারী হতে দেখা গেছে।

— ডাঃ ডবিউ. এ. ইংলিং

- ৩) পাপিউরা (purpura) এবং রক্তক্ষরণে একাধিকবার সাফল্য লাভ করেছে এসিড-ফস।

— ডাঃ মার্গারেট টাইলার

- ৪) উপদংশজ শিরঃপীড়া, রাত্রিকালিন শিরঃপীড়ায় অরম ভালো কাজ করে বিশেষ করে অরম-আয়োড।

— ডাঃ ডোনার

- ৫) যকৃতের সিরোসিসের ফলে শোথ যখন অন্তিম অবস্থায় পৌঁছায় তখন এসিড-মিউর অত্যন্ত উপকারী।

— ডাঃ ই. এ. ফ্যারিংটন

- ৬) গর্ভাবস্থায় আহারের পর বমনে এসিড-কার্ব উপকারী।

- ৭) ইনফ্লুয়েঞ্জার মহামারীতে এসিড-সারকোল্যাক্টিক অতুপকারী।

— ডাঃ উইলিয়ম গ্রিগ্‌স্

- ৮) মেরুদণ্ডের স্নায়বিক দুর্বলতা, পেশীর দুর্বলতা, শ্বাসকৃচ্ছতা, হৃৎযন্ত্রের দুর্বলতা এবং রক্তবিষনে (Toxaemia) এসিড-সারকোল্যাক্টিক অত্যন্ত উপকারী।

— ডাঃ উইলিয়ম গ্রিগ্‌স্।

- ৯) ব্রনকাইটিস এবং তরুন বাত ব্যাধিতে ব্রাইওনিয়া নির্দেশিত হলে ও অনেক সময় ব্রাইওনিয়া প্রয়োগে কোন কাজ হয়না। কিন্তু প্রথমে একোনাইট প্রয়োগ করে ব্রাইয়োনিয়া দিলে উপকার দর্শে।

— ডাঃ হেল

- ১০) দাঁত দিয়ে নখ কাটা বা ছেঁড়ার কারন যেখানে কোনপ্রকার স্নায়বিক উত্তেজনা, সেখানে রেপার্টরীতে যে একটি মাত্র ওষুধের উল্লেখ রয়েছে তা হলো এমোনিয়াম-ব্রোমেটান। ওষুধটি সত্যিই কার্যকর।

— ডাঃ জিয়ার (Gier)

- ১১) চুল ঝরার উপসর্গ নিরায়ম করার দৃষ্টান্ত রেখেছে অ্যালো-স।

— ডাঃ রাডক্

- ১২) বামচোখের তারারন্ধ্রের অস্বাভাবিক প্রসারণে (Mydriasis) এনাকার্ডিয়ামের কথা ভাবতে হবে।

— ডাঃ মিলার ডিকম্যান

- ১৩) প্রত্যেকটি নিঃশ্বাসই যেন শেষ নিঃশ্বাস, এই অনুভূতি শুধুমাত্র যে বক্ষরুদ্ধক (বক্ষশোথ) রোগীর মধ্যে দেখা দেয় তা নয় এটা স্নায়বিক লক্ষণও হতে পারে এক্ষেত্রে এপিস-মেল নির্দেশিত হয়।

— ডাঃ ই. বি. ন্যাশ্

- ১৪) দীর্ঘকাল স্থায়ী ও গভীরমূলাশ্রয়ী পাকস্থলীর ক্ষত সঙ্গে রক্তবমন আর্জেন্ট-নাইট্রিকের সুখ্যাতি রয়েছে।

— ডাঃ হিউজেস্

- ১৫) আক্ষেপিক শ্বাসককৃচ্ছতায় যখন ইপিকাক ও আর্সেনিক অকৃতকার্য হয়, তখন কার্যকার ওষুধ হল অ্যাসপিডোস্পার্মাইন।

— এডুইন্ এম. হেল্

- ১৬) দুর্বল হৃৎপিণ্ড সহজে উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং হৃৎস্পন্দন বেড়ে যায় এ অবস্থায় অত্যন্ত মূল্যবান ওষুধ আর্সেনিক-এল্।

— ডাঃ এলেন

- ১৭) কৃষ্ণবর্ণে বিবর্ণ ত্বক অন্য কোন নির্দেশক লক্ষণ না থাকলে আর্স-এল্

৩ বা ৬ প্রত্যহ একবার যতদিন না ত্বকের বর্ণ স্বাভাবিক হয়।

— ডাঃ পি শঙ্করণ

- ১৮) সাধারণ সর্দিতে যখন জলীয় শ্রাব বইতে থাকে তখন আর্স এন্ড ৩x ৪ মাত্রা প্রয়োগ করাই যথেষ্ট।

— ডাঃ পি. এস. কামঠান

- ১৯) ফিসচুলা বা ভগন্দর যতই পুরাতন হক না কেন প্রতি একদিন অন্তর পর্যায়ক্রমে আর্স এন্ড ২০০ ও সাইলি ২০০ প্রয়োগ করলে শীঘ্রই আরোগ্য হয়।

— ডাঃ জি. মুখার্জি

- ২০) অস্টিওমাইলাইটিস রোগের অগ্রগতি রোধ ও আরোগ্য করা যায়। যদি প্রারম্ভিক অবস্থায় আর্নিকা ১এম প্রয়োগ করা হয়।

— ডাঃ টি. পি. চ্যাটার্জি

- ২১) মাথাব্যথা ও আধকপালে (Migraine) ব্যথার উপশম দিতে হোমিও অ্যাসপিরিন উত্তম ওষুধ। ইহার ২০০ অথবা ২x শক্তি প্রয়োগ করবেন। আক্রমণের পরে নয়।

— ডাঃ টি. পি. চ্যাটার্জি

- ২২) চোখের ভুর চুল পড়ে যাওয়াতে যেখানে ক্যালি কার্ব ব্যর্থ হয়। সেখানে এনাথেরাম দিয়ে অবশ্যই চেষ্টা করবেন।

— ডাঃ আর. বি. দাশ

- ২৩) স্ত্রী যন্ত্রাদির উপর জেনোসিয়া অশোকার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

— ডাঃ ডি. এন. রায়

- ২৪) পায়ের উর্দ্ধগামী পক্ষাঘাতের ওষুধ হচ্ছে আর্স-এন্ড ৩x দিনে ৩ বার করে দিতে থাকুন, রোগী কয়েকদিনের মধ্যেই হাটতে সক্ষম হবে।

— ডাঃ টি. পি. চ্যাটার্জি

- ২৫) স্তনের ক্যান্সার চিকিৎসায় এস্টেরিয়াস-রিউবেস অত্যন্ত দরকারী।

— ডাঃ পি. এল. বার্থেল

- ২৬) বৃদ্ধ ব্যক্তিদের মাথা বিমঝিম (cerebral stasis) করায় বেলিস-

পিরেনিস ভালো কাজ করে, এমনকি চিরস্থায়ী সুস্থতা এনে দেয়।

— ডাঃ জে. সি. বার্নেট

- ২৭) উচ্চ রক্তচাপে যখন সিস্টোলিক চাপ বেশী থাকে এবং ডায়াস্টোলিক চাপ কম থাকে তখন ব্যারাইটা-মিউর।

— ডাঃ এস. আর. ওয়াদিয়া

- ২৮) পায়ের আঙ্গুলের বাতজনিত স্ফীতি এবং মূত্রের স্বল্পতা লক্ষণে যেখানে অন্যান্য ওষুধ নিষ্ফল হয়েছে সেখানে বাবেরিস-ভালগেরিস আমাকে সাহায্য করেছে।

— ডাঃ যুগল কিশোর

- ২৯) যখন কোন শিশু (পুং বা স্ত্রীং) ঘরের মেজেতে বসে অথবা উবু হয়ে শুয়ে সঙ্গম করার ভঙ্গী করতে থাকে, তখন বিউফো প্রয়োগে ঐ বদ অভ্যাস দূর হয়।

— ডাঃ জেম্‌স্

- ৩০) জুরে ব্রাইওনিয়া নির্বাচিত হলে, তার ক্রিয়া বারো ঘণ্টার মধ্যে দেখা যাবে ও সেক্ষেত্রে প্রচুর ঘাম হবে। কিন্তু গর্ভবতীদের ক্ষেত্রে সাবধানতা দরকার কারন ওষুধটি এই অবস্থায় খুবই ক্ষতিকর।

— ডাঃ এইচ. সি. মরো ও ডাঃ কোয়াকেনবুস

- ৩১) শিশু বা বালকদের শয্যামূত্রের ক্ষেত্রে ভালো ওষুধ ব্যাসিলিনাম-টেস্টাম।

— ডাঃ ফুবিস্টার (Foubister)

- ৩২) নির্দিষ্ট বিকারতাত্ত্বিক (Pathological) পরিবর্তন ব্যতিরেকে রক্ত সঞ্চয় জনিত স্ফীতি ব্যাসিলাস-মর্গানে নিরাময় হয়েছে।

— ডাঃ উইলিয়ম বি. গ্রিগ্‌স্

- ৩৩) উদরাময়ে যখন ক্রোটন-টিগ পডো, আর্স-এন্ড এবং ম্যাগ-কার্ব প্রয়োগে সাময়িক উপকার হয় আবার বেড়ে যায়। সেখানে নোসোড ব্যাসিলাস-কোলাই ২০০ তিন মাত্রা একদিন ব্যবহারে ৮০% ভাগ ক্ষেত্রে আরোগ্য হয়।

— ডাঃ জেম্‌স্

৩৪) শিশুদের দন্তোদগমনকালে বিরক্তিকর মেজাজ ও সবুজ দুর্গন্ধযুক্ত মল সহ জ্বর হলে ক্যামো ৬ ও বেল ৬ পর্যায়ক্রমে উভয়ের ৩ মাত্রা করে প্রযোজ্য।

— ডাঃ ইদত্ কাম্ঠান্

৩৫) বাতের যন্ত্রনার জন্য নিদ্রাহীনতায় আমি বেলেডোনা ২x বারবার প্রয়োগ করি।

— ডাঃ কাথ্‌বার্ট

৩৬) হার্নিয়া রোগের চিকিৎসায় বেল ১x ও ন্যাক্স-ভুম ১x অত্যুপকারী; প্রথম ৩/৪ দিন প্রত্যহ দু'ঘণ্টা অন্তর পরিবর্তিত পছায় প্রযোজ্য; পরে এক সপ্তাহ কাল ৫/৬ ঘণ্টা অন্তর এবং পরবর্তী একমাস প্রত্যহ ও সন্ধ্যায় একমাত্রা করে পরিবর্তিত প্রথায় প্রদেয়।

— ডাঃ ডি, ডব্লিউ, বাউয়েন

৩৭) আমবাতে বা অন্যান্য উদ্ভেদে রাসটক্স বিফল হলে বোভিস্টা কার্যকর হয়।

— ডাঃ মরো ও কোয়াকেনবুস্

৩৮) মাসিকের আগে বা পরে পাতলা বাহ্যে হলে বোভিস্টা স্বস্তব্য।

— ডাঃ উইলিয়াম গ্রিগ্‌স্

৩৯) অগ্নিদগ্ধ হওয়ার পর রোগী যদি বলে যে পুড়ে যাওয়ার পর থেকে কখনও সে সুস্থ থাকেনি তাহলে কস্টিকাম।

— ডাঃ গানসী

৪০) অন্যান্য অ্যান্টিসোরিক অপেক্ষা কস্টিকাম-এর ক্রিয়া বিলম্বে শুরু হয়।

— ডাঃ মরো ও ডাঃ কোয়াকেনবুস্

৪১) অস্ত্রোপচারের পর মূত্রবন্ধে কস্টিকাম একটি বাঁধাধরা ঔষধ।

— ডাঃ ডি. এম. ফুবিস্টার

৪২) হৃদরোগীর ক্রমবর্ধিত নিদ্রাহীনতায় ক্রেটেগাস ৪ ত্রিশ ফোঁটা আধ গ্লাস জলে মিশিয়ে প্রতি তিন ঘণ্টায় এক চামচ।

—ডাঃ বোগার